




Classificação CTG

FIGO guidelines

Guidelines FIGO 2015 revistas sobre a monitorização fetal intraparto

	Normal	Suspeito	Patológico
Linha de base	110-160 bpm		<100 bpm
Variabilidade	5-25 bpm	Falta de pelo menos um critério de normalidade, mas sem critérios de patológico	Variabilidade reduzida. Variabilidade aumentada. Padrão sinusoidal.
Desacelerações	Desacelerações não repetitivas*		* Desacelerações tardias repetitivas ou prolongadas para > 30 min (ou > 20 min, se redução da variabilidade). Desaceleração > 5 min
Interpretação	Sem hipóxia/ acidose	Baixa probabilidade de hipóxia / acidose	Alta probabilidade de hipóxia / acidose
Clinical management	Sem necessidade de intervenção para melhorar o estado de oxigenação fetal.	Acção para reverter a causa se identificada. Monitorização próxima ou métodos adjuvantes.	Medidas imediatas para corrigir causas reversíveis, métodos adjuvantes ou se não for possível acelerar o parto. Em situações agudas, o parto imediato deverá ser realizado.



* As desacelerações são repetitivas quando relacionadas com > 50% de contrações. Ausência de acelerações em trabalho de parto é de significado incerto.